

LES GANTS SEULEMENT AU BON MOMENT !

Pour limiter la pénurie

NE JAMAIS LES UTILISER DANS CES SITUATIONS

- soins sur peau saine, y compris pour la toilette et chez les patients en Précautions Complémentaires

- réfection du lit, rangement du linge propre et distribution des repas

Les gants ne doivent pas être portés en continu car risque de contamination du patient, du soignant et de l'environnement, sauf dans de rares situations (infection à C. difficile ou gale)



POUR CONTINUER A SE PROTÉGER LORS DES SOINS

- si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques

- si contact avec une peau lésée ou une muqueuse

- dès lors que les professionnels de santé présentent des lésions cutanées aux mains

Indications gants nitrile

- ponction veineuse ou artérielle,
pose de cathéter périphérique

- manipulation des
chimiothérapies et urines de
patient sous chimio



Indications gants vinyle

- toilette intime, manipulation
du linge sale

- manipulation de liquides
biologiques

- évacuation des excréta

- retrait des pansements sales



POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX, MÉNAGEONS LES GANTS À USAGE UNIQUE EN UTILISANT LES GANTS RÉUTILISABLES

(Norme : EN ISO 374-1 : 2016)

Ils sont :

- nominatifs (2 paires minimum)

- désinfectés entre chaque chambre, sanitaire commun, local sale ... avec une lavette imprégnée de détergent-désinfectant

- en fin de journée, lavés intérieurement et extérieurement avec de l'eau et du savon et laissés sécher à l'envers

- changés dès que leur porosité est constatée



Quel que soit le type de gant, il faut réaliser une friction hydroalcoolique avant de les mettre et après leur retrait... MAIS JAMAIS SUR LES GANTS !